

Avertissements agricoles



Bulletin n° 24 du 13 septembre 1988

Numérotation continue : n° 76

- ATTENTION AUX LIMACES
- COLZA :
 - . Ravageurs d'automne : liste de produits

ATTENTION AUX LIMACES :

De nombreuses parcelles de colza doivent être resemées suite aux importantes infestations de limaces.

Dans ce cas, que faire après un traitement au BUTISAN S ?

- . au moment de semer, travailler de préférence en **semis direct** ou de **façon très superficielle**
- . en cas de **semis de précision**, augmenter la quantité de semence à l'ha de manière à limiter les problèmes de sélectivité
- . pas de traitement pré-levée. Réaliser éventuellement (risque de fortes infestations de capselles) un traitement de post-levée précoce avec du BUTISAN S à 1,5 l/ha.

Rappel : Les limaces s'annoncent donc comme étant très voraces cette année. Une surveillance efficace de leur présence est utile et simple à mettre en œuvre : il suffit de placer une poignée de molluscides sous un abri. L'observation de cadavres de limaces sous le piège permet de déclencher un traitement en plein (voir liste des produits dans bulletin du 07 septembre). Restez vigilants jusqu'au stade 2 feuilles du colza et n'oubliez pas que les mêmes attaques peuvent se renouveler au moment des semis de céréales.

Rectificatif QUARTZ GT

Cette nouvelle spécialité, citée dans notre bulletin n° 22 du 24 août, ne doit pas être utilisée en pré-levée sur orge, mais uniquement en post-levée à partir du stade 3 feuilles. Son utilisation sur blé reste inchangée.

Imprimerie de la Station de NANCY

Directeur-Gérant : D. VERBEKE

Publication Périodique

CPPAP N° : 2011 AD

Abonnement annuel : 185 F

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

38-40, rue Sainte-Catherine

54000 NANCY

Tél. 83.30.41.51.



P 123

COLZA : RAVAGEURS D'AUTOMNE

De la levée à la fin du repos hivernal		Produits utilisables (1)	
Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Matières actives	Spécialités commerciales
0,15 l.		alphaméthrine	Fastac
0,10 l.		biphenthrine	Fastac 10
0,07 l.		cyfluthrine	Talstar
0,30 l.	0,30 l.	cyperméthrine	Baythroid
0,25 l.		deltaméthrine	Cymbush, Kafil super
25 g. m.a./ha		endosulfan	Nombreuses spécialités (2)
0,20 l.		esfenvalérate	Décis CE - Décis RU - Décis Flo
250 g. m.a./ha		fenvalérate	Nombreuses spécialités (2)
0,60 l.		fluvalinate	Sumi alpha
0,50 l.		lambda cyhalothrine	Sumicidin 10
0,20 l.		lindane	Mavrik
0,15 l.		lindane huileux	Karaté
200 g. m.a./ha		malathion	Nombreuses spécialités (2)
200 g. m.a./ha		méthidathion	Nombreuses spécialités (2)
1,5 l ou 1,5 Kg		parathion éthyl	Ultracide 20 bouillie - Ultracide 20 liquide
1,25 Kg		parathion méthyl	Nombreuses spécialités (2)
200 g. m.a./ha		parathion huileux	Nombreuses spécialités (2)
200 g. m.a./ha		endosulfan + parathion éthyl	Drifène AP - Ekadrine PE
0,75 l.		lindane + parathion éthyl	Sopragam
1,0 l.		lindane + parathion méthyl	Typholine gamma 50
3,0 l.		phosalone + parathion méthyl	Paralindex
1,75 l.			Fortène
0,75 l.			Taxylone

(1) Doses en l. ou Kg de produit commercial par ha

(2) La dose de matière active par hectare mentionnée correspond à la dose de matière la plus fréquente. Avant toute utilisation, vérifier la dose de produit commercial autorisée sur l'étiquette.